


NAION-Patienten:

Ansprechpartner:
Studienarzt STZ
Tel: 07071-29
87435
PI: Prof. Wilhelm

Studienauge:

- **< 14 Tage** Sehverschlechterung, einseitig
- GF Defekte >-3dB
- 50 – 80 Jahre
- klare Medien
- keine Makulopathie
- **therapienaiv**
- keine ppV
- keine okuläre Entzündung
- IOD < 25mmHg
- **Visus:**
 - Studienauge: >0,04
- **Dauer: 12 Monate (ca. 8 Visiten)**



Stand: 09.03.2018

QRK 207 – WIRKUNG + SICHERHEIT VON QPI-1007

QPI-1007 als einfache oder mehrfache **IVOM** bei akuter nicht-arteriitischer anteriorer, ischämischer Optikusneuropathie

QPI-1007 = **small interfering ribonucleic acid (siRNA-Medikament)**, verhindert die Produktion des Proteins **Caspase 2**, welches von Zellen, die einen Sauerstoffmangel durchleben, vermehrt produziert wird und am Zelltod beteiligt ist

5 Gruppen:

- Shaminjektion
- 1,5mg QPI-1007 + Shaminjektion
- 1,5mg QPI-1007
- 3,0mg QPI-1007
- 3,0mg QPI-1007 + Shaminjektion

Jeder Patient erhält **3 Injektionen** innerhalb der Studie

-randomisiert, doppelmaskiert, placebokontrolliert-

aktuell Rekrutierungsstopp aufgrund Änderungen im Protokoll